Facharzt für Gastroenterologie

AM FACHARZTZENTRUM HEIDELBERG (FAZN)

PROF. DR. R. EHEHALT, FEBGH

INNERE MEDIZIN • ENDOSKOPIE • GASTROENTEROLOGIE



Biopsie Schnelltest zum Nachweis der Laktose

Unverträglichkeit in nur 20 Minuten im Rahmen

einer Magenspiegelung.

<u>Hintergrund – Laktose Intoleranz</u>

Die Laktose Intoleranz resultiert aus der Unfähigkeit, Laktose (Milchzucker) aus Milchprodukten zu verdauen. Als Ursache gilt ein Mangel des Enzyms Laktase, dass im Dünndarm produziert wird.

Laktose (Milchzucker) findet sich in fast allen Milchprodukten wie z.B., Sahne, Quark, Joghurt, Eis und Käse.

Laut Schätzungen leiden 20% der West- und Nordeuropäer, sowie 90% der übrigen Weltbevölkerung an Laktose Intoleranz.

Die Laktose Intoleranz kann zu folgenden Beschwerden führen:

- Blähungen
- abdominales Völlegefühl,
- Krämpfe und Schmerzen
- Durchfall

Im Rahmen einer Magenspiegelung kann jetzt schnell die Laktose Intoleranz diagnostiziert werden. Der patentierte und zugelassene Test der Firma BIOHIT (Patient-Nr. DE 600 12 723 0) beruht auf der Analyse einer Biopsieprobe.

Mit Hilfe von Reagenzien wird durch eine Farbreaktion innerhalb von nur 20 Minuten eine mögliche Intoleranz gegenüber Milchzucker nachgewiesen.



Ihre Vorteile:

- Der Schnelltest kann sofort während Ihrer Magenspiegelung durchgeführt werden und erspart somit weitere Tests
- der alternative H2 Atemtest, an einem neuen Termin, dauert dagegen 4 Stunden

Wir berechnen Ihnen nur die Materialkosten von 35,00 €, da der Test nicht von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen wird.